

Efecto de la salinidad sobre la frecuencia ventilatoria branquial de *Dormitator latifrons* (Richardson, 1984)

Effect of salinity on the branchial ventilatory frequency of *Dormitator latifrons* (Richardson, 1984)

Ana Antonia Zapata¹ , Fernando Vega-Villasante¹ , Olimpia Chong-Carrillo¹ , Manuel Alejandro Vargas-Ceballos¹ , Daniel Badillo-Zapata^{1,2*} 

¹Laboratorio de Calidad de Agua y Acuicultura Experimental, Departamento de Ciencias Biológicas, Centro Universitario de la Costa, Universidad de Guadalajara, Av. Universidad de Guadalajara no. 203, Del. Ixtapa, CP. 48280. Puerto Vallarta, Jalisco, México.

²Cátedras CONACyT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), Ciudad de México, México.

*Autor de correspondencia: danielbad00@hotmail.com

Nota científica recibida: 13 de marzo de 2019 **aceptada:** 20 de junio de 2019

RESUMEN. *Dormitator latifrons* habita en un amplio intervalo de salinidades producto de su ciclo migratorio y reproductivo. El objetivo del trabajo fue evaluar el tiempo de respuesta fisiológica y la sobrevivencia al cambio salino en condiciones de laboratorio. Se registró la frecuencia ventilatoria branquial (FVB) basal de organismos a 33 ups (AS) y en agua dulce 0.3 ups (AD). Se contabilizó la frecuencia ventilatoria branquial de organismos que fueron transferidos AD-AS e inversamente AS-AD (15, 25, y 33 ups), por triplicado, durante 1 minuto, 1, 4, 24 y 48 h. Se encontraron diferencias estadísticas ($p < 0.05$) en los peces transferidos de AD-AS y AS-AD al primer minuto con respecto a FVB basal. En todos los tratamientos los organismos recuperaron la FVB una hora después de ser expuestos a la modificación salina. Se tuvo un 100% de sobrevivencia en todos los tratamientos, *D. latifrons* tiene rápida respuesta fisiológica a cambios bruscos de salinidad.

Palabras clave: Adaptación, condiciones ambientales, estrés, Pez nativo.

ABSTRACT. *Dormitator latifrons* inhabits a wide range of salinities product of its migratory and reproductive cycle. Our objective was to evaluate physiological response time and survival to saline change in laboratory conditions. The basal branchial ventilatory frequency (FVB) of organisms at 33 ups (AS) and in fresh water 0.3 ups (AD) was registered. The branchial ventilatory frequency of organisms transferred AD-AS and inversely AS-AD (15, 25, and 33 ups) was determined, in triplicate, during 1 minute, 1, 4, 24 and 48 h. Statistical differences were found ($p < 0.05$) in the fish transferred from AD-AS and AS-AD at the first minute with respect to basal FVB. In all treatments, organisms returned to baseline one hour after being exposed to saline variation. A survival of 100% was recorded in all treatments. *D. latifrons* shows a rapid physiological response to sudden changes of salinity.

Key words: Adaptation, environmental conditions, stress, native fish.

INTRODUCCIÓN

La familia Eleotridae, se componen de alrededor de 150 especies de distribución mundial, que habitan en aguas marinas, salobres y dulces, *Dormitator latifrons* es representante de esta familia, conocido como dormilón gordo del Pacífico, chopopo, chame, puyequé o popoyote (Nordlie y Haney 1993). Es un pez originario de climas templados y subtropicales, tiene valor comercial en las costas de Ecuador,

además que se le puede encontrar en ríos, manglares y en lugares tan extremos como charcas o fuera del agua mientras haya humedad (Vicuña 2010, López-Huerta *et al.* 2018). Una característica de esta especie es su alta resistencia fisiológica que le permite sobrevivir en lugares donde se presentan concentraciones bajas de oxígeno disuelto, amplio intervalo de temperatura (Castro-Rivera *et al.* 2005), variaciones de salinidad (Chang 1984), encontrándose de forma frecuente en aguas salobres (Yáñez-Arancibia

y Díaz-González 1977).

En su medio natural *D. latifrons* puede experimentar grandes variaciones de salinidad, pero se tiene poca información sobre la capacidad para enfrentar el estrés osmótico (Todd 1975). La presión osmótica interna de los peces varía dependiendo en el ambiente acuático en el que se desarrollen; los peces de agua dulce poseen una concentración osmótica superior a la de su medio, mientras que en los peces marinos las sales, en los fluidos corporales, se encuentran más diluidas que el agua de mar (Christensen *et al.* 2017). La osmorregulación es la forma en la que los organismos pueden controlar o mantener estable su medio interno, cuando se exponen a diversas salinidades ambientales, algunos peces solo toleran salinidades similares en las que residen (Kültz 2015). A las especies que tiene la capacidad de sobrevivir dentro de ciertos intervalos de salinidades se les denomina eurihalinas y estas pueden ser de dos tipos, las que toleran y se adaptan a fluctuaciones rápidas de la salinidad externa y las que realizan migraciones en algún momento de su ciclo vital entre medios dulceacuícolas y marinos (Nordlie y Haney 1998). Gran parte del trabajo sobre las respuestas osmorreguladoras se ha realizado principalmente en salmónidos (Serrano *et al.* 2011). Basado en lo anterior, en este trabajo se evaluó la tolerancia fisiológica al cambio de salinidad, bajo condiciones de laboratorio, de *D. latifrons*, con el objetivo de aportar conocimiento sobre la capacidad de osmorregulación bajo condiciones controladas, y establecer las condiciones ambientales en las que puede ser mantenida en cultivo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para el desarrollo del estudio se colectaron 200 organismos juveniles de *D. latifrons* (Laguna El Quelele, Nayarit, México), con peso 10.0 ± 2.0 g y talla 13.1 ± 2.2 cm, los cuales se transportaron en un contenedor de 1 000 L con aireación constante al Laboratorio de Calidad de Agua y Acuicultura Experimental (LACUIC) del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, Jalisco, México. Los peces se transfirieron a un es-

taque de 1 700 L para cuarentena y mantenimiento a salinidad de 22 ups (unidades prácticas de salinidad), misma salinidad a la que se encontraban en el medio natural. Durante este periodo se suministró un alimento balanceado comercial con 35% proteínas y 8% lípidos, aireación constante y temperatura de 24.0 ± 1.0 °C.

Una vez transcurrido el periodo de cuarentena y adaptación al alimento balanceado, se seleccionaron 100 organismos al azar y se colocaron en dos unidades experimentales (UE) de 450 L (50 organismos por UE) con peso y longitud promedio de 8.5 ± 1.0 g y 9.5 ± 1.0 cm respectivamente. Previo a la colocación de los organismos se realizó un ajuste a la salinidad para mantener salinidades de 0.3 y 33 ups. La modificación de la concentración salina del agua se realizó de manera paulatina incrementando y/o disminuyendo 0.5 ups por hora hasta alcanzar la salinidad deseada partiendo de la salinidad de aclimatación. Durante el periodo del cambio salino se registró la sobrevivencia.

Durante 30 días los peces se mantuvieron a las salinidades ajustadas y se alimentaron con el alimento mencionado previamente, aireación constante y recambio de agua del 20% semanal. De los tratamientos de 0.3 y 33 ups se seleccionaron al azar seis organismos con peso y longitud promedio de 10.3 ± 0.5 g y 11.5 ± 1.0 cm respectivamente, los cuales se colocaron de forma individual en acuarios de 20 L, para luego medir la frecuencia ventilatoria branquial (FVB) por medio de los movimientos operculares por minuto, para obtener la frecuencia ventilatoria branquial basal por minuto (FVB basal).

Para determinar la capacidad de los peces de soportar cambios bruscos de salinidad, se seleccionaron al azar tres organismos que se encontraban en el tratamiento de 0.3 ups y se colocaron de forma individual en acuarios de 40 L, aforados a 20 L de agua a 15 ups, la cual se obtuvo de la mezcla de agua de mar (33 ups) con agua dulce. Los peces se introdujeron de forma directa a la salinidad ajustada, y se mantuvieron por 5 minutos (tiempo de estabilización) para posteriormente proceder a medir la FVB por 60 segundos. Las medidas se realizaron a las 1, 4, 24 y 48 h con un contador manual. La

misma metodología se llevó a cabo para determinar la FVB de los peces transferidos de 0.3 a 25 y de 0.3 a 33 para los peces acondicionados a 33 ups y transferidos a 25, 15 y 0.3 ups.

Análisis estadístico

Para determinar las diferencias entre los tratamientos, se realizó una prueba de homogeneidad para después realizar un análisis de varianza. El nivel de significancia se estableció con una $p < 0.05$. Cuando se detectaron diferencias estadísticas, se utilizó una prueba post hoc de Dunnett para identificar diferencias estadísticas entre tratamientos. Los análisis se realizaron con el programa estadístico GraphPad Prism[®] 6.01.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el medio natural los organismos acuáticos tienen la capacidad de trasladarse de un lugar a otro hasta encontrar las condiciones fisiológicas adecuadas, cuando las variables fisicoquímicas del agua cambian de manera negativa para su óptimo desarrollo. Pero en condiciones de cultivo los organismos están confinados en espacios restringidos y no pueden desplazarse hacia mejores condiciones ambientales y se genera un estrés que puede desencadenar la aparición de enfermedades o la muerte. El estrés es una condición en la cual el equilibrio dinámico u homeostasis es afectado, amenazado o perturbado por estímulos internos o externos (Corredor y Landines 2009). Los cuales pueden producir respuestas en las que interviene una serie de reacciones bioquímicas y fisiológicas que le permiten recuperar su homeostasis y adaptarse a una nueva situación. Lo que resulta en mayor estado de alerta y movilización de energía (Barreto y Volpato 2004, Blancas-Arroyo *et al.* 2014).

La FVB en los peces se utiliza como indicador de estrés o alerta al reconocimiento visual de un depredador (Barreto *et al.* 2003), como indicador de sobrevivencia de peces o de estrés en ambientes con altos niveles de amonio (Blancas-Arroyo *et al.* 2014). También se ha reportado que la FVB es una respuesta muy sensible a la perturbación y una

técnica no invasiva que no requiere equipos sofisticados para evaluar el bienestar o estados de estrés en los peces (Barreto y Volpato 2004). Al respecto se observó que en condiciones de agua dulce con 0.3 ups, la FVB en juveniles de *D. latifrons* tuvo un promedio de 50.7 ± 4.2 ventilaciones por minuto, pero al modificar la salinidad, se tuvieron diferencias estadísticas significativas entre tratamientos ($p < 0.05$) (Figura 1). Los tratamientos de 0.3-15 y 0.3-33 ups tuvieron un promedio de 75.3 ± 5.7 y 103.3 ± 20.2 ventilaciones por minuto, respectivamente; durante el primer minuto de haber sido expuestos al choque osmótico con diferencias estadísticas significativas en la FVB basal (Figura 1a). Después de una hora de la transferencia los peces, solo se observaron diferencias estadísticas entre el tratamiento 0.3-33 ups (Figura 1b). Para las horas subsecuentes la FVB de ningún tratamiento presentó diferencias estadísticas (Figura 1c, d y e).

Sobre la capacidad fisiológica de *D. latifrons* para enfrentar los choques osmóticos, se reporta que el efecto de la salinidad de organismos capturados en agua dulce y transferidos a agua salada a concentraciones de 35, 40, 42, 45 y 50 ups, tuvieron una salinidad media letal de 42 ups (Chang 1984). Con respecto a la respuesta osmoadaptativa de *D. latifrons*, se reporta una supervivencia elevada en la transferencia directa de diferentes concentraciones de agua dulce al agua de mar (Becerra 1997). Lo que indica que este pez es capaz de hipoosmorregular, lo que sugiere su carácter anfídromo, por lo que es capaz de emigrar desde y hacia medios marinos durante todo su ciclo de vida.

En relación con la FVB de los peces transferidos de agua salada (33 ups) ha agua dulce (0.3 ups), se observaron diferencias significativas. Los tratamientos 15-0.3, 25-0.3 y 33-0.3 ups tuvieron una FVB promedio de 79.9 ± 9.0 , 94.3 ± 9.3 y 84.7 ± 7.4 ventilaciones por minuto, respectivamente; al primer minuto de haber sido expuestos al agua dulce, con diferencias significativas (Figura 2a). A los 60 min se encontraron diferencias estadísticas significativas ($p < 0.05$) con los tratamientos 15-0.3 y 33-0.3 ups con una FVB de 64.3 ± 4.0 y 79.7 ± 1.5 ventilaciones por minuto, respectivamente (Figura 2b). Por otra parte,




Figura 1. Frecuencia Ventiladora Branquial (FVB) de juveniles de *D. latifrons* transferidos de agua dulce hacia agua salada (0-15, 0-25, 0-33 ups), a), b), c), d) y e) FVB de los juveniles *D. latifrons* expuestos a los tratamientos con respecto al tiempo. Tratamientos con letras diferentes demuestran diferencias significativas ($p < 0.05$).

se encontraron diferencias significativas a las 4, 24 y 48 h, en el tratamiento 33-0.3 ups con respecto a la FVB basal con valor de 67.0 ± 5.6 a las 4 h y de 58.3 ± 7.1 ventilaciones por minuto a las 24 y 48 h de haber sido expuestos al cambio (Figura 2c, d y e).

Durante el proceso de aclimatación a distintas salinidades como en todos los casos de cambio salino se presentó un 100% de sobrevivencia. Lo que sugiere una alta capacidad de *D. latifrons* adaptarse a concentraciones salinas variables incluso soportar




Figura 2. Frecuencia Ventilatoria Branquial (FVB) de juveniles de *D. latifrons* transferidos de agua salada hacia agua dulce (15-0, 25-0, 33-0 ups), a), b), c), d) y e) FVB de los juveniles *D. latifrons* expuestos a los tratamientos con respecto al tiempo. Tratamientos con letras diferentes demuestran diferencias significativas ($p < 0.05$).

cambios bruscos. Al respecto, se sabe que algunos peces eurihalinos tienen la capacidad fisiológica de adaptarse más rápido a los cambios en la salinidad del agua, compensando la situación acelerando el proceso de equilibrio osmótico (Bœuf y Payan 2001). Pero en el caso de que el proceso de adaptación

no se lleve a cabo de manera rápida, el organismo entra en una fase de resistencia, en la que libera corticoides adrenales que pueden derivar en situaciones letales provocando la muerte de los organismos (Marrero-Hernández 2008). Al respecto, Nordlie y Haney (1993) evaluaron las tolerancias de

salinidad y las concentraciones osmóticas de plasma para *D. maculatus* especie homóloga de *D. latifrons* en las costas del Atlántico americano, encontrando un límite de tolerancia entre 75 y 80 ups, con sobrevivencia del 47% de los peces sometidos a 80 ups. Sobre la tolerancia a la salinidad se sabe que la capacidad de un pez para aclimatarse a diferentes niveles de salinidad ambiental depende de su capacidad para regular la absorción y la excreción de iones, y mantener su equilibrio hidromineral (Zhao *et al.* 2011, Blancas-Arroyo *et al.* 2014). Los juveniles de *D. latifrons* fueron capaces de sobrevivir durante 30 días, tanto bajo condiciones de agua dulce (0.3 ups) como marinas (33 ups), sin aparente estrés; incluso bajo condiciones hiperosmóticas, cuando los peces retornaron a la FVB basal desde la primera hora, lo que confirma su carácter eurihalino.

Los resultados del presente estudio coinciden con los resultados de Nordlie y Haney (1993), con relación a las concentraciones secuenciales a las que fueron expuestos y la capacidad de regresar a la FVB basal al ser transferidos de agua salada a agua dulce y viceversa con un 100% de sobrevivencia. Por lo que *D. latifrons* es un pez que muestra alta capacidad fisiológica de adaptación a ambientes con cambios salinos, por lo que se confirma su carácter eurihalino y su importancia ecológica al poder ocupar diversos nichos tróficos. Además, tales características lo hacen un buen candidato para ser cultivado en agua dulce y agua salobre. Por lo que se requiere ampliar los estudios sobre el efecto de la salinidad en el crecimiento, costo energético y fisiológico de *D. latifrons*, para establecer los márgenes osmóticos óptimos en los que puede desarrollarse de manera adecuada y sin estrés.

LITERATURA CITADA

- Barreto RE, Luchiari AC, Marcondes AL (2003) Ventilatory frequency indicates visual recognition of an allopatric predator in naïve Nile tilapia. *Behavioural Processes* 60: 235-239.
- Barreto RE, Volpato GL (2004) Caution for using ventilatory frequency as an indicator of stress in fish. *Behavioural Processes* 66: 43-51.
- Becerra GE (1997) Respuestas osmoadaptativas del Guapote juvenil (*Dormitator latifrons*, Richardson, 1837) durante transferencia directa al agua de mar. *Tecnociencia* 1: 50-56.
- Blancas-Arroyo GA, Frías-Sevilla R, De La Rosa-Pimentel E, Suárez-Navarro V, Castro-Gómez JR, Magaña-Morales J (2014) Efecto de la salinidad en la sobrevivencia de peces silvestres del género *Chirostoma* durante el transporte y mantenimiento en laboratorio. *Hidrobiologica* 24: 223-230.
- Bœuf G, Payan P (2001) How should salinity influence fish growth? In: Grosell M (ed.) *Comparative biochemistry and physiology - C Toxicology and pharmacology*. Elsevier. Miami, Florida, USA. pp: 411-423.
- Castro-Rivera R, Aguilar-Benítez G, Hernández-Girón JP (2005) Conversión alimenticia en engordas puras y mixtas de Popoyote (*Dormitator latifrons* Richardson) en estanques de cemento. *Revista AquaTIC* 23: 45-52.
- Chang BD (1984) Tolerances to salinity and air exposure of *Dormitator latifrons* (Pisces: Eleotridae). *Revista Biología Tropical* 32: 155-157.
- Christensen EAF, Svendsen MBS, Steffensen JF (2017) Plasma osmolality and oxygen consumption of perch *Perca fluviatilis* in response to different salinities and temperatures. *Journal Fish Biology* 90: 819-833.
- Corredor AS, Landines MA (2009) Efecto del ácido áscorbico sobre la respuesta de los peces ante condiciones de estrés. *Revista de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia* 56: 53-66.
- Kültz D (2015) Physiological mechanisms used by fish to cope with salinity stress. *Journal of Experimental Biology* 218: 1907-1914.

- López-Huerta J, Vega-Villasante F, Viana M, Carrillo-Farnes O, Badillo-Zapata D (2018) First report of nutritional quality of the native fish *Dormitator latifrons* (Richardson, 1844) (Perciformes: Eleotridae). *Latin American Journal of Aquatic Research* 46: 849-854.
- Marrero-Hernández MJ (2008) Estrés osmóticos en *Chelone labrosus* (Risso, 1827). *Anales Universitarios de Etología* 2: 56-61.
- Nordlie FG, Haney DC (1998) Adaptations in salt marsh teleosts to life in waters of varying salinity. *Italian Journal of Zoology* 65: 405-409.
- Nordlie FG, Haney DC (1993) Euryhaline adaptations in the fat sleeper, *Dormitator maculatus*. *Journal of Fish Biology* 43: 433-439.
- Serrano SJ, Grosell M (2011) Osmoregulatory capabilities of the gray snapper, *Lutjanus griseus*: Salinity challenges and field observations. *Marine and Freshwater Behaviour and Physiology* 44: 185-196.
- Todd ES (1975) Vertical movements and development of the prolarvae of the eleotrid fish, *Dormitator latifrons*. *Copeia* 3: 564-568.
- Vicuña O (2010) *Dormitator latifrons* (Chame). En: Flores-Nava A, Brown A (Ed.) *Peces nativos de agua dulce de América del Sur de interés para la acuicultura: Una síntesis del estado de desarrollo tecnológico de su cultivo*. FAO. Serie Acuicultura en Latinoamérica Número 1. Roma, Italia. pp: 63-70.
- Yáñez-Arancibia A, Díaz-González G (1977) Trophic-dynamic ecology of *Dormitator latifrons* (Richardson) in nine coastal lagoons on the Pacific coast of Mexico. (Pisces: Eleotridae). *Instituto de Ciencia del Mar y Limnología* 19: 140.
- Zhao F, Qu L, Zhuang P, Zhang L, Liu J, Zhang T (2011) Salinity tolerance as well as osmotic and ionic regulation in juvenile Chinese sturgeon (*Acipenser sinensis* Gray, 1835) exposed to different salinities. *Journal of Applied Ichthyology* 27: 231-234.

