

# ESTUDIO TRANSETNICO DEL ALCOHOLISMO: DESCENDIENTES DE LOS MAYAS-CHONTALES E INMIGRANTES NAHUAS\*

Klaus-Dieter Gorenc  
Dirección de Investigación, Instituto  
Nacional de Ciencias Penales,  
Magisterio Nacional 113;  
14000 México, D.F.

## RESUMEN

Las actitudes frente a las bebidas alcohólicas de los mayas-chontales y nahua fueron ubicadas respecto al esquema cultura-criterio diseñado por Bales (1946). El primer grupo étnico mencionado probablemente presentó un perfil de cultura permisiva con distorsión funcional relacionado con un criterio utilitario, que se traduce en una tasa elevada de alcoholícos; mientras que el segundo, representa a una cultura permisiva con un consumo ritual y estos dos componentes se vinculan con un bajo riesgo de alcoholismo. Esta clasificación se sostuvo por la diferencia observada entre las referidas etnias respecto a los indicadores indirectos y directos; esto es, por cada nahua que falleció por cirrosis alcohólica, 4.5 mayas-chontales murieron por este padecimiento. Validado el Test de Alcoholismo Munich (MALT) en ambos grupos étnicos, se observó una razón similar; es decir, por cada alcoholíco nahua, 4.9 fueron mayas-chontales. Estas diferencias podrían ser explicadas por la disimilitud detectada del control social de la esfera privada ejercido durante la época prehispánica. Asimismo, se determinó que el 23% de los 31 reactivos de la prueba fueron consistentes en presentar semejanzas entre ambas muestras de alcoholícos.

Palabras clave: Riesgo alcohólico, diferencia étnica, Tabasco.

## ABSTRACT

The mayas-chontales and nahua's attitudes toward ethylic beverages were indirect systematized in reference to the culture-criterion scheme designed by Bales (1946). The first reported ethnic group probably showed a profile of the permissive with functional distortion culture connected with an utilitarian criterion, which is translatable into a high alcoholic rate; while the second cluster denote a permissive culture with a ritual consume, both components converged on a low alcoholic risk. The classification could be supported by the observed differences between the mentioned ethnics in connection with indirect and direct indicators; i.e., for each nahua which deceased by alcoholic cirrhosis, 4.5 mayas-chontales died of the same disease. Having validated the Munich Alcoholism Test (MALT) in both ethnic groups, it was observed a similar ratio; i.e., for each nahua alcoholic, 4.9 were mayas-chontales. These differences could be sustenance by the dissimilarities detected on the social control of private life during the Prespanish ascendant amidst the surveyed groups. It was also determined that 23% of the 31 items of the test was very consistent in revealing similarities between both alcoholic samples.

Key words: Alcoholism risk, ethnical differences, Tabasco.

\* La comparación se logró estructurar con el apoyo de la beca recibida como Investigador Nacional Nivel 1 (1986).